

# Ficha técnica

# Pherocon DBM

## Feromona en dispensador para monitoreo

- Para el monitoreo y captura del macho de la palomilla dorso de diamante *Plutella xylostella* (L) hacia la trampa utilizada



## Especificaciones de producto

### Producto

Pherocon DBM (Diamondback Moth)

### Descripción

Dispensador de caucho gris de aproximadamente 2 cm de alto y 0.9 cm de diámetro en la base, impregnado con feromona sexual para el monitoreo del macho de la palomilla dorso de diamante *Plutella xylostella* (L).

Envasado en empaque individual de aluminio herméticamente sellado.

### Ingredientes activos

- Z-11-Hexadecenal
- Z-11-Hexadecenyl Acetate
- Z-11-Hexadecenol
- Z-11-Tetradecen-1-OL

### Modo de acción

El dispensador libera la feromona sexual de manera controlada durante aproximadamente 4 semanas y atrae al macho de la palomilla dorso de diamante *Plutella xylostella* (L) hacia la trampa utilizada.

## Recomendaciones de uso

### Tipos de trampa que se pueden utilizar:

Trampa tipo ala.

- Colocar un dispensador dentro de la trampa

### Altura de la trampa:

Sujetar la trampa con el alambre en una estaca a una altura de 10 cm sobre la planta, subir la trampa según su crecimiento.

## Dosis

Colocar de 2 a 3 trampas por cada 5 ha de cultivo en los perímetros del campo. Para un monitoreo más preciso se pueden utilizar hasta 5 trampas/ha en “cinco de oros”.

## Consideraciones:

1. Mantener el dispensador dentro de su empaque original cerrado hasta que se vaya a instalar la trampa.
2. Iniciar el monitoreo al momento de la plantación y continuar durante todo el ciclo.
3. Identificar las trampas y hacer un croquis de su localización.
4. Revisar las trampas 1 a 2 veces por semana. Contar los insectos y retirarlos.
5. Llevar un registro de todo, graficar los resultados para su interpretación y tomar decisiones.
6. Si es la primera vez que utiliza este sistema de monitoreo, relacionar los resultados con su anterior sistema.
7. Cambiar el dispensador cada 4 semanas (nunca utilizar más de 1 dispensador por trampa).
8. Siempre usar trampas en buenas condiciones.
9. Nunca dejar los dispensadores usados y los empaques vacíos en el campo.

---

## Compatibilidad

No interfiere con otras medidas de control.

---

## Toxicidad

El ingrediente activo no es fitotóxico, no es tóxico a las aves, mamíferos o insectos.

---

## Registros

Exento de registro en México. Oficio COFEPRIS No. 203300CO220119/2021.

---

## Almacenamiento

Dentro de su empaque original cerrado y a temperatura ambiente (menor a 24o C), el producto tiene una vida útil de: 1 año; refrigerada o congelada: 2 años. Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa.

## Fabricante

TRÉCÉ INC. 7569 Hwy 28 W P. O. Box 129, Adair, OK 74330-0129, USA.

---

## Importador y distribuidor

Ferommis, S.A. de C.V., Ramón G. López Hass 54-A, Desarrollo Urbano La Primavera, Culiacán, Sin. C.P. 80300, México.  
Tel. (667)-712-30-30  
R.F.C. FER-110504-SA0

---

### **¡Importante!**

*Todos los complementos se venden por separado.*

*Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o sus empresas afiliadas).*

*Solo se deben usar productos autorizados en su país o estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales.*

*Koppert no se responsabiliza del uso no autorizado del producto.*

*Koppert no se responsabiliza de la pérdida de calidad, si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado o bajo condiciones no apropiadas.*